



Instructies voor gebruik



Dosering:

Afhankelijk van de situatie:

Bij biggen:

Eerste levensweek:
10 gram
per liter water.

Rondom het spenen:
5 tot 10 gram
per liter water.

Bij zeugen:

5 gram
per liter water.

Hoe ziet u dat OREXTROL® haar werk doet:

Biggen drinken meer water.

Biggen hebben meer honger.

Minder voerweigeraars na het spenen.

OREXTROL® voor zeugen

-
- 5 gram per liter water**

i In schone voerbak voordat de zeugen gevoerd worden.
- Hoeveelheid: **5 liter per voerbeurt**
- 1 tot 2 dagen totdat de zeug weer goed eet.**

OREXTROL® voor zogende biggen

-
- 10 gram per liter water**

i Controleer extra of er OREXTROL® in de bakjes zit. **i** Verhoog het aantal liter met 50 - 100%.
- Hoeveelheid: **Onbeperkt**
- Direct bij geboorte starten met OREXTROL gedurende 7 dagen.**

OREXTROL® rondom het spenen

-
- 5 - 10 gram per liter water**
- Hoeveelheid: **Onbeperkt**
- 2 dagen voor het spenen beginnen tot 3 dagen na het spenen.**

> Hoe werkt OREXTROL®?

OREXTROL® bevat Umami en elektrolyten. Deze stoffen stimuleren de eetlust en maakt het varken hongerig. Meer honger zal een betere en hogere opname van het voer, water of melk geven.

> Wanneer past u OREXTROL® toe?

- Gedurende eerste week na geboorte voor een goede start van big en zeug.
- Rondom het spenen om de voeropname na het spenen goed te laten verlopen.
- Zeugen die onvoldoende willen eten om de voeropname op peil te houden.

> Meer informatie?

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u terecht op www.nuvan.nl

OREXTROL®

